



[XML](#) [RSS](#) ISIS members area [log in](#)

ISIS has a new office. Please see our [contact](#) details

ISIS Report 07/03/05

Views and goods advertized are not necessarily endorsed by Science in Society or the Inst. of Science in Society.

OGM : Le glyphosate est toxique et le " Roundup " est encore plus mauvais

Announces Google

Glyphosate 95% TC & SL
Formulation type:95% TC, AS, SL etc Support All the World & Best Price.

www.ChinaHydrazineHyd

SIS
Editeur de logiciels : SDIS, SAMU, Marchés Publics et Huissiers
www.sis-france.com

Solutions herbicides
Luttez contre les mauvaises herbes Optez pour les solutions Syngenta !
www.syngenta-agro.fr/he

Enzymes Digestives
Formulation renforcée biodisponible Excellent rapport qualité-prix !
www.Super-Smart.eu

Résumé :

A la lumière de nouvelles preuves scientifiques, le Docteur Mae-Wan Ho et le Professeur Joe Cummins réclament une révision urgente de la réglementation relative à l'herbicide le plus largement répandu dans le monde.

Source : *Glyphosate toxic and "Roundup" worse* . Mae-Wan-Ho et Joe Cummins. ISIS Press Release 07/03/2005 .

"The Institute of Science in Society" = ISIS, est une organisation basée à Londres, Grande Bretagne. Le site web est <http://www.i-sis.org.uk> Les informations générales concernant cet institut sont disponibles auprès de Sam Burcher, joignable par sam@i-sis.org.uk L'institut ISIS est dirigé par Mae-Wan HO, dont la messagerie est m.w.ho@i-sis.org.uk Le texte original en anglais et les références sont accessibles par les membres de l'ISIS sur le web par : <http://www.i-sis.org.uk/GTARW.php>

De nouveaux résultats de recherches soulèvent des inquiétudes sérieuses quant à la sécurité liée à l'emploi de l'herbicide le plus généralement utilisé [spécialité commerciale « **Roundup** » dont la matière active est le **glyphosate**]. Ces résultats devraient se traduire par des ondes de choc auprès des partisans des cultures de plantes génétiquement modifiées pour être tolérantes à cet herbicide. Ces cultures représentent maintenant 75% de toutes les plantes génétiquement modifiées et cultivées à travers le monde.

Mais le pire réside dans le fait que la formulation [commerciale] la plus commune de cet herbicide est bien plus toxique que la matière active elle-même qu'elle contient ; par ailleurs, cette spécialité commerciale est fabriquée par le même géant des biotechnologies qui a créé les plantes génétiquement modifiées et tolérantes à cet herbicide.

L'herbicide à large spectre d'action à base de glyphosate (N-(phosphonométhyl)glycine], est généralement vendu sous la formulation commerciale « Roundup » (du groupe Monsanto, de Saint Louis, dans l'état du Missouri aux Etats-Unis). Il a été fréquemment employé sur des cultures, ou des sols nus, dans le monde entier, depuis son introduction dans les années 1970.

La spécialité commerciale est une association de glyphosate avec d'autres produits chimiques comprenant un agent tensioactif mouillant (détergent), le polyoxyéthylèneamine qui favorise la dispersion des gouttelettes pulvérisées sur les feuilles des plantes. L'utilisation du « Roundup » a particulièrement augmenté dans les pays où l'on cultive des plantes génétiquement modifiées – et tolérantes à cet herbicide – qui ont été créées par Monsanto.

Search the websi



Search

printer friendly version

Recer Publicat



Green Energy 100% Renewable by 2020

must-read for the climate" I discount available Order Now | More



The World's Worst Phys Orga

"Probably the Important Book of the Coming S Revolution" Now its Third Edition Buy Now | More



Fossil Fuel Futu Now *Org *Sus

*Fossil Fuel Futu How organic agriculture can localised food energy) system potentially compensate for greenhouse gas emissions of human activities free us from fossil fuels Buy Now | More



only science mag earth

Science in Society OUT NOW! Order your copy from online store.



GM Science Exposure

A comprehensive dossier containing more than 160 references and information from the Science Society archive Buy Now | More

GMC Exposing the

Annonces Google

Étude Auxiliaire
Puériculture

Prépa Concours
d'Entrée Ecoles.
Cours par
Correspondance
de Qualité
www.CoursMinerve.com/

Paraquat
Every thing you
ever wanted to
know about
Paraquat
www.paraquat.com

Bilan thermique
climatisation
Bénéficiez d'une
étude thermique
gratuite et sans
engagement !
ecotherm.fr/etude-thermi

Evamed
Suivi clinique par
internet eCRF et
statistiques
www.evamed.fr

Le glyphosate tue les plantes en inhibant une enzyme, la synthétase 5-~~énolpyruvyl-shikimate-3-phosphate (= EPSPS)~~, laquelle est nécessaire pour la synthèse des acides aminés aromatiques tels que la phénylalanine, la tyrosine et le tryptophane; ces acides aminés participent à la synthèse des vitamines et de beaucoup de métabolites secondaires tels que les **folates**, l'**ubiquinone** et des **naphthoquinones**.

On a cru pendant longtemps que cet herbicide avait une action plutôt spécifique et qu'il était moins toxique que d'autres herbicides, parce que la voie biochimique du shikimate n'est pas présente chez les mammifères ni chez les humains. Cependant, le glyphosate agit en empêchant la liaison du phosphoénol pyruvate au niveau du site actif de l'enzyme, et le phosphoénol pyruvate est un métabolite central qui est présent dans tous les organismes vivants; de ce fait, il présente la potentialité d'affecter d'autres voies métaboliques.

Ceci a été confirmé par beaucoup d'études portant sur la toxicité liée à cet herbicide ; ces travaux publiés ont été passés en revue dans le rapport intitulé « **The Case for a GM-free Sustainable World** » qui a été diffusé par l'ISP (Independent Science Panel), un jury international pour une science indépendante [1].

Une étude épidémiologique conduite dans l'Ontario et portant sur des populations d'agriculteurs a prouvé que l'exposition de ceux-ci au glyphosate a presque doublé le risque des avortements spontanés tardifs [2]. Le Professeur Gilles-Eric Séralini et son équipe de recherche de l'université de Caen en France, ont de leur côté décider d'approfondir les effets de cet herbicide sur les cellules du placenta humain.

Ils ont maintenant prouvé que le glyphosate **est** toxique pour les cellules placentaires humaines, tuant une grande proportion de celles-ci après 18 heures d'exposition à des concentrations inférieures à celles qui sont employées en agriculture [3]. De plus, le « Roundup » est toujours plus toxique que sa matière active, le glyphosate : sa toxicité est au moins le double. Cet effet augmente au cours du temps et il a été obtenu avec des concentrations de « Roundup » 10 fois plus faibles que celles utilisées dans les pratiques agricoles.

L'enzyme aromatase est un précurseur de la synthèse des oestrogènes (hormones femelles) à partir des androgènes (les hormones mâles). Le glyphosate interagit avec le site actif de l'enzyme mais son effet sur l'activité enzymatique s'est montré minimal, tout au moins tant que le « Roundup » n'était pas impliqué.

Mais il est intéressant de souligner que le « Roundup » a augmenté l'activité enzymatique après une heure d'incubation, probablement en raison de son effet d'agent tensioactif, en rendant le substrat des androgènes plus disponible pour l'enzyme. Mais après une l'incubation de 18h, le « Roundup » a invariablement inhibé l'activité enzymatique. L'inhibition étant associée à une diminution de la synthèse des ARN messagers, ce qui suggère que le « Roundup » diminue le taux de transcription de gène. Séralini et ses collègues suggèrent que d'autres ingrédients dans la formulation commerciale du « Roundup », augmentent la disponibilité ou l'accumulation du glyphosate dans les cellules.

Il y a, en effet, une évidence directe que le glyphosate inhibe la transcription de l'ARN chez les animaux à une concentration qui se situe bien au-dessous du niveau qui est recommandé pour l'application en pulvérisation de la spécialité commerciale. La transcription a été inhibée et le développement embryonnaire a été retardé chez des oursins après une exposition à de faibles concentrations de l'herbicide et/ou de l'agent tensioactif, le polyoxyéthylèneamine. **On doit considérer ce pesticide comme pouvant**

Haze

Biotechnology
Ensure the Ir
of our Food S
Buy Now | Mor

Join the I-SIS
list; enter you
address

html <
subscri

I-SIS is a n
profit organi
dependin
donatio
membersh
subscription
merchandise
continue its
Find out mor
membersh

08-10

présenter un risque pour la santé par inhalation lors d'une application par pulvérisation [4].

Une recherche récente a prouvé qu'une brève exposition au glyphosate commercial avait endommagé le foie chez des rats, comme indiqué par la dispersion des enzymes intracellulaires dans cet organe. Dans cette étude, le glyphosate et son agent tensioactif contenu dans la spécialité « Roundup » se sont également avérés agir en synergie pour augmenter les dommages au niveau du foie [5].

Trois études de cas récentes ont suggéré une association entre l'utilisation de glyphosate et le risque du **lymphome non-hodgkinien** [6-8]. Par ailleurs, une étude épidémiologique menée dans les états de l'Iowa et de la Caroline du Nord, aux Etats-Unis, qui comprend plus de 54.315 utilisateurs privés et applicateurs professionnels de pesticides, suggère un lien entre l'utilisation de glyphosate et le **myélome multiple** [9]. Le myélome a été associé aux agents qui causent soit des dommages au niveau de l'ADN, soit une suppression de l'immunité. Ces études n'ont pas fait de distinction entre la spécialité commerciale « Roundup » et la matière active, le glyphosate et il serait important que des recherches soient entreprises.

Il y a maintenant un ensemble de preuves selon lesquelles l'emploi du glyphosate exige :

- ***des mises en garde pour la santé publique au niveau mondial et***
- ***une nouvelle révision de la réglementation concernant ce produit herbicide.***

En attendant, son utilisation devrait être réduite à un minimum, par mesure de prudence et de précaution.

Références bibliographiques

1. The Case for a GM-Free Sustainable World, Chapter 7, ISIS & TWN, London & Penang, 2003.
2. Savitz DA, Arbuckle , Kaczor D, Curtis KM. Male pesticide exposure and pregnancy outcome. *Am J Epidemiol* 2000, 146, 1025-36.
3. Richard S, Moslemi S, Sipahutar H, Benachour N. and Seralini GE. Differential effects of glyphosate and roundup on human placental cells and aromatase. *Environ Health Perspect.* 2005 Jun;113(6):716-20
4. Marc J, Le Breton M, Cormier P, Morales J, Belle ´R and Mulner-Lorillo O. A glyphosate-based pesticide impinges on transcription. *Toxicology and Applied Pharmacology* 2005, 203, 1-8.
5. Benedetti AL, de Lourdes Vituri C, Trentin AG, Domingues MAC and Alvarez-Silva M. The effects of sub-chronic exposure of Wistar rats to the herbicide Glyphosate-Biocarb. *Toxicology Letters* 2004, 153, 227-32.
6. De Roos AH, Zahm SH, Cantor KP, et al. Integrative assessment of multiple pesticides as risk factors for non-Hodgkin's lymphoma among men. *Occup Environ Med* 2003, 60, E11
<http://oem.bmjournals.com/cgi/content/full/60/9/e11>
7. Hardell L, Eriksson M, Nordstrom M. Exposure to pesticides as risk factor for non-Hodgkin's lymphoma and hairy cell leukemia: pooled analysis of two Swedish case-control studies. *Leuk Lymphoma* 2002, 43,1043-1049.
8. McDuffie HH, Pahwa P, McLaughlin JR, Spinelli JJ, Fincham S, Dosman JA, et al . 2001. Non-Hodgkin's lymphoma and specific pesticide exposures in men: cross-Canada study of pesticides and health. 2001, *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev* 2001,10,1155-63.
9. De Roos AJ, Blair A, Rusiecki JA, Hoppin JA, Svec M, Dosemeci M, Sandler DP and Alavanja MC. Cancer incidence among glyphosate-

exposed pesticide applicators in the agricultural health study. *Environ Health Perspect* 2005, 113, 49-54.

The Institute of Science in Society, PO Box 51885, London NW2 9DH
telephone: [44 20 8643 0681] [44 20 7383 3376] [44 20 7272
5636]

General Enquiries sam@i-sis.org.uk - Website/Mailing List press-release@i-sis.org.uk

Définitions et compléments :

Aromatase ou cytochrome P450 : c'est une l'enzyme qui synthétise les oestrogènes à partir des androgènes. Les aspects médicaux et génétiques du déficit en aromatase sont consultables en français sur le site : <http://www.orpha.net/static/FR/aromatase.html>

Folates ou acide folique ou vitamine B9 isolée en 1945 dans les épinards ; elle abonde dans les feuilles des végétaux. Et on la trouve aussi dans les fromages fermentés « bleus ». Les folates sont indispensables pour les fonctions suivantes : synthèse de l'ADN, de l'ARN, des protéines et de certains neuromédiateurs, respiration cellulaire et transport de l'oxygène dans les hématies.

Lymphome non hodgkinien : un groupe de cancers qui prennent naissance dans les cellules du système lymphatique. De plus amples détails en français peuvent être trouvés sur les sites : http://www.cancer.ca/ccs/internet/standard/0,,3172_10175_314423_langId-fr,00.html et <http://www.celmedbio.com/francais/produits/LNH.html>

Myélome multiple des os ou maladie de Kahler : maladie qui se traduit par une prolifération maligne des plasmocytes, initialement localisée à la moelle osseuse. Le plasmocyte est une variété de cellule lymphoïde qui se trouve dans la moelle osseuse et surtout dans le tissu lymphoïde. Normalement, on ne le trouve pas dans le sang. Il sécrète les immunoglobulines. Dans le myélome, il y a prolifération médullaire de plasmocytes qui fabriquent et excrètent un type unique d'immunoglobuline (monoclonale) qu'on peut retrouver dans le sang et les urines. Cette maladie apparaît en général après 40 ans et touche plus souvent l'homme que la femme. Les informations médicales sont notamment disponibles sur les sites suivants :

<http://www.med.univ-tours.fr/enseign/locomoteur/myelome.htm> et <http://www.medinfos.com/principales/fichiers/pm-hem-kahler4.shtml>

Ubiquinone : molécule dont l'une des chaînes latérales comporte 10 composés appelés isoprénoïdes (ces composés sont semblables à ceux que l'on trouve dans les aromates et les épices), d'où le nom de **coenzyme Q10** (**ou coQ10**). Sa structure moléculaire est proche de celle de la vitamine K mais sa fonction s'apparente à celle de la vitamine E. Présente dans toutes les cellules du corps (d'où son appellation qui rappelle l'ubiquité), elle est un fournisseur d'énergie et un antioxydant, capable en outre de soigner l'insuffisance cardiaque et l'infertilité masculine. Pour plus d'information, l'on peut consulter notamment les deux sites suivants :

<http://www.thierrysouccar.com/edito/edito016.html> et http://www.lexpress.mu/display_article.php?news_id=12487

Naphthoquinones ou **naphthoquinones** : molécules phénoliques trouvées dans certaines essences de bois associées à des tanins et des flavonoïdes. Elles présentent un fort pouvoir antioxydant et elles sont toxiques pour les

organismes pathogènes (bactéries, champignons, insectes). L'effet antioxydant s'explique par le fait que ces diverses substances piègent des molécules intermédiaires très réactives, en propageant les réactions d'oxydation qui, très souvent, sont des réactions en chaîne. L'effet antimicrobien de cinq naphthoquinones a été analysé vis-à-vis la bactérie phytopathogène *Erwinia carotovora* .

Voir : http://pubs.nrc-cnrc.gc.ca/cgi-bin/rp/rp2_abst_e?cjm_w04-088_50_ns_nf_cjm11-04

Note : les lecteurs de français peuvent aussi se reporter à l'article « **Le Roundup n'intoxique pas que les mauvaises herbes** » de **Hervé Morin** , journal « **Le Monde** », dimanche 13-lundi 14 mars 2005, page 17.

Traduction, définitions et compléments en français :

Jacques Hallard, Ing.CNAM, consultant indépendant
Adresse : 2240 chemin du Tilleul F.13160 Châteaurenard
Courriel : jacques.hallard@wanadoo.fr



Gesslein Trend 704 000

Description | Best Deals | Search | [Chitikal](#)

Gesslein Trend 704 000

Babyparadies-shop

The Institute of Science in Society, The Old House 39-41 North Road, London N7 9DP
telephone: [44 20 7700 5948] [44 20 8452 2729]

Contact the Institute of Science in Society

**MATERIAL ON THIS SITE MAY NOT BE REPRODUCED IN ANY FORM WITHOUT EXPLICIT PERMISSION!
FOR PERMISSION, PLEASE CONTACT ISIS**